

РИСК ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КЛЕЩЕВЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ СНИЖАЕТСЯ ТОЛЬКО В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРАВИЛЬНО ОКАЗАННОЙ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ВОВРЕМЯ НАЧАТОГО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

ИНФЕКЦИИ КЛЕЩЕВЫЕ ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ!

ПОЧЕМУ ОПАСНЫ КЛЕЩИ?

КЛЕЩИ – ПЕРЕНОСЧИКИ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА, БОРРЕЛИОЗА, МОНОЦИТАРНОГО ЭРЛИХИОЗА, ГРАНУЛОЦИТАРНОГО АНАПЛАЗМОЗА И ДРУГИХ ИНФЕКЦИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ИНВАЛИДНОСТИ, А ИНОГДА И СМЕРТИ

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРИСОСАВШЕГОСЯ КЛЕЩА **НЕЗАМЕТЛИТЕЛЬНО** ОБРАТИТЕСЬ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ В ПОЛИКЛИНИКУ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ И УСТАНОВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ

МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

- ✚ для отпугивания клещей использовать специальные средства – **репелленты**
- ✚ следует одеваться так, чтобы максимально закрыть открытые участки тела, в одежду светлых тонов (чтобы легче заметить клеща), в качестве обуви лучше использовать резиновые сапоги, а голову прикрывать косынкой или капюшоном
- ✚ через каждые 2 часа проводить само- и взаимоосмотры на наличие присосавшихся клещей
- ✚ после посещения лесопарковых зон отдыха, дачных участков, обязательно осматривать одежду, шерсть домашних животных, проводить ревизию принесенных в дом из леса и дачных участков вещей
- ✚ для снижения численности клещей требуется обеспечить благоустройство своих дачных участков, дворовых территорий, проводить уборку прошлогодней листвы, расчистку от бытового и растительного мусора, окультуривание кустарников, выкашивание травы, не допускать захламленности, уничтожать мышевидных грызунов
- ✚ **НЕ УПРОТРЕБЛЯТЬ В ПИЩУ СЫРОЕ КОЗЬЕ МОЛОКО И ПРОДУКТЫ ИЗ НЕГО!**
вирус клещевого энцефалита чувствителен к высоким температурам и погибает при 2 минутном кипячении

**ЭКСТРЕННАЯ
ХИМИОПРОФИЛАКТИКА
КЛЕЩЕВЫХ ИНФЕКЦИЙ
ДОЛЖНА НАЧИНАТЬСЯ НЕ
ПОЗДНЕЕ 72 ЧАСОВ ПОСЛЕ
УКУСА**



СПОСОБЫ УДАЛЕНИЯ КЛЕЩА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ



БЛИЖЕ К ХОБОТКУ И, ПОВОРАЧИВАЯ, ВЫКРУТИТЕ ЕГО. ОБЫЧНО ЧЕРЕЗ 1-3 ОБОРОТА КЛЕЩ ИЗВЛЕКАЕТСЯ ЦЕЛИКОМ ВМЕСТЕ С ХОБОТКОМ.

1.
АККУРАТНО
ЗАХВАТИТЕ
ПИНЦЕТОМ
ГОЛОВКУ
КЛЕЩА КАК
МОЖНО



ХОБОТКУ КЛЕЩА. КЛЕЩА ИЗВЛЕКАЮТ, ПОДТЯГИВАЯ ЕГО ВВЕРХ ПРИ ПОМОЩИ КРУГОВЫХ ДВИЖЕНИЙ. РЕЗКИЕ ДВИЖЕНИЯ НЕДОПУСТИМЫ.

2.
ПРОЧНУЮ
НИТЬ
ЗАВЯЗЫВАЮТ
В УЗЕЛ, КАК
МОЖНО
БЛИЖЕ К



3.
КЛЕЩА
МОЖНО
УДАЛИТЬ С
ПОМОЩЬЮ
КЛЕЩЕВЕРТА
ИЛИ РУЧКИ
ЛАССО.

ВНИМАНИЕ

! Ни в коем случае не тяните и не сдавливайте клеща, не используйте растительные масла, спиртовые растворы и другие жидкости до и во время его удаления во избежание попадания содержимого клеща в ранку.

! Место укуса обработайте йодом или спиртосодержащим раствором, а руки тщательно вымойте с мылом.

Удаленного клеща, при желании, можно исследовать на наличие возбудителя клещевого боррелиоза в лабораториях центров гигиены и эпидемиологии г.Брест, г.Кобрин. В вирусологической лаборатории Брестского областного ЦГЭиОЗ осуществляется лабораторное исследование клещей, снятых с тела человека на определение инфицированности основными возбудителями заболеваний человека (четыре инфекции): Лайм боррелиоза, клещевого энцефалита, гранулоцитарного анаплазмоза, моноцитарного эрлихиоза методом мультиплексной ПЦР.
Контакт. тел. 40171